

पोस्टर क्रमांक २

तंबाखू सेवन करणाऱ्याचे शरीर




- मेंदू**
- तंबाखूच्या सेवनामुळे मेंदूचे आघात होऊ शकतात.
 - निकोटीन सततक्ता आणि अल्पकालीन रसायन शक्ती वाढवते.
 - निकोटीन, काळान मानवकसाईड आणि इतर रसायने स्तकवाहिन्यांचे नुकसान करतात, ज्यामुळे रक्त गंठत.
 - तंबाखूमध्ये आढळारी रसायने व्यासनाधीन करणाऱ्या असतात.

- फुफ्फुस**
- तंबाखूच्या सेवन हे कर्करोगामुळे होणाऱ्या मुत्युषेप्रभाव काणण आहे. दहावाकी नुजुक फुफ्फुसाचा कर्करोग तंबाखूच्या सेवनामुळे होतात.
 - तंबाखूच्ये आढळारी रसायने फुफ्फुसाचा उत्तीर्ण नुकसान करतात. तंबाखूच्या सेवनामुळे वायवाहिनी आकृत्याचन पावतात, त्यामुळे व्यसनाचे दीर्घकालीन आजार होतात.
 - धूम्रपान केल्याने दमा आणि ब्रॅक्टाय - टिस्याचा त्रास अधिक वाढतो.
 - तंबाखूच्या सेवनाने टीवी होण्याचा धोका वाढवता.

- पोट**
- पोटाचा कर्करोग हा जगातील दुसरा सर्वव्यापी कर्करोग आहे. तंबाखूच्या सेवनामुळे पोटाचा कर्करोग आणि आतज्ज्ञासंबंधी अल्सर होण्याचा धोका वाढतो.

- प्रजनन प्रणाली**
- तंबाखूच्या सेवनाने स्त्री आणि पुरुष दोघांची प्रजनन क्षमता कमी होते.
 - तंबाखूच्या सेवनाने पुरुषांमधील शुक्राणुच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो, शुक्राणुची संख्या कमी होते आणि वायाचे प्रमाण कमी होते.
 - धूम्रपान शुक्राण विकृत करू शकते आणि डीएनएल नुकसान पोहाचवू शकते.
 - धूम्रपान पुरुषांमध्ये उत्तेजना कमी करण्याचा धोका वाढवते.
 - तंबाखूच्या सेवनाने महिलांमध्ये गर्भाशय्या कर्करोगाचा धोका वाढतो.



डोळा

- तंबाखूच्या सेवनाने डोळ्याच्या मागील भागाला अपरिवर्तनीय हानी होते.
- मोतीविठू होण्याची शक्यता वाढवते, ही अशी रिथ्ति आहे ज्यामुळे अधिक येऊ शकते.
- तंबाखूतील काही रसायने जसे की अमोनिया आणि फोर्मिलिडहाइड डोळ्यामध्ये जाळजल निर्माण करतात.

तोंड आणि घसा

- तंबाखूच्या सेवनाने हे तोंड आणि घशाच्या कर्करोगाचे मुख्य कारण आहे.
- तंबाखू घद्यल्यान सब - म्यूक्रस फायब्रारिस होतो (कर्करोगपूर्वी रिथ्ति) जी खूप वेदनादायक रिथ्ति असता.
- धूम्रपानामुळे घशाचा कर्करोग होतो.
- धूम्रपान आणि तंबाखू घद्यल्याने श्वासाची दुर्बाधी, दातांवर डाग आणि हिरड्याचे आजार होतात.

हृदय

- तंबाखूच्या हृदयविकाराचा झटका (हार्ट अटैक) आणि छातीतील वेळना (ऐंजिना) होण्याचा धोका वाढतो.
- तंबाखूमध्ये आढळारी रसायने रक्त वाहिन्या अर्बें कलन नुकसान करतात आणि रक्त गोठपण्याची प्रक्रिया वाढवतात.
- सिगरेट आणि बिडामध्ये आढळाणाच्या काळीन मानो आंकिकाइड हृदयापर्यंत ऑक्सिजन पोहोचण्याचे प्रमाण कमी करतात.
- निकोटीन हृदय गती आणि रक्तदाब (ब्लेड प्रेशर) वाढवते.

गर्भवती महिला

- तंबाखूचे सेवन करण्याचा गर्भवती महिलांच्या गर्भाचे वजन कमी होते.
- तंबाखूच्या वापरामुळे मुदतपूर्व प्रसूती आणि मृत बाळाच्या जन्माची शक्यता वाढतो.

बाह्य रक्तवाहिन्यासंवंधी रोग

- धूम्रपानामुळे पायाच्या धमन्या, शिरा आणि मज्जातंत्राना तरंग आणि सूज येते त्यामुळे रक्तप्रवाह मोक्या प्रमाणात कमी होतो, अगदी बाधित पाय कापावाही लागतो.